

Modifications de la CIM–10 introduites en 2020

Pour l'année 2020, l'ATIH édite une version actualisée complète de la liste analytique du volume 1 de la CIM–10 à usage PMSI. Cette version (CIM–10 FR 2020) sera publiée au *Bulletin officiel 2020/9 bis*, et est consultable et téléchargeable sur [le site Internet de l'ATIH](#).

La présente note décrit tout d'abord les principales modifications liées aux mises à jour introduites dans le volume 1 de la CIM–10 pour 2020 puis les restitue en détail. Dans cette seconde partie, générée automatiquement par le logiciel CTK (Classification Tool Kit) utilisé pour la gestion et la publication de la CIM–10, les suppressions de texte sont mentionnées en police rayée bleue et les ajouts en police rouge, et ce, quelle que soit l'origine, OMS ou ATIH, de ces modifications. Les codes encadrés par une bordure en pointillés sont des modifications apportées par l'ATIH pour les besoins du PMSI.

Cette version 2020 prend en compte une modification infraannuelle de l'OMS.

1. Modifications apportées par l'OMS

Les modifications OMS introduites le 24 Septembre 2019 concernent :

L'emploi de code U d'utilisation particulière pour le classement provisoire d'affections nouvelles d'étiologie incertaine

En réaction à l'apparition récente d'affections liées au vapotage, l'OMS estime qu'il serait pertinent de pouvoir suivre tous les cas rapportés, jusqu'à ce que des informations plus détaillées soient disponibles.

Le libellé **U07.0 Affection liée au vapotage** est introduit :

- dans la catégorie U07 dénommée à cet effet *Affections d'étiologie incertaine*
- dans le *Chapitre XXII Codes d'utilisation particulière*

Pour la classification PMSI, ce code est autorisé en diagnostic associé dans les séjours concernés.

2. Modifications apportées par l'ATIH

Concernent quelques corrections de forme apportées notamment aux notes de certains codes.

Chapitre I

Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)

Tuberculose (A15-A19)

A18 Tuberculose d'autres organes

A18.1† Tuberculose de l'appareil génito-urinaire

Affection inflammatoire tuberculeuse des organes pelviens de la femme† (N74.1*)

Tuberculose (de) :

- col de l'utérus† (N74.0*)
- organes génitaux de l'homme† (N51.-*)
- rénale† (N29.1*)
- urètre† (N29.1*)
- vessie† (N33.0*)

A18.3† Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques

Ascite	tuberculeuse
Entérite† (K93.0*)	
Péritonite† (K67.3*)	

Tuberculose (de) :

- anus et rectum† (K93.0*)
- intestin (côlon) (grêle)† (K93.0*)
- rétropéritonéale (ganglions lymphatiques)

A18.5† Tuberculose de l'œil

Choriorétinite† (H32.0*)	tuberculeuse
Épisclérite† (H19.0*)	
Iridocyclite† (H22.0*)	
Kératite interstitielle† (H19.2*)	
Kératoconjonctivite (interstitielle) (phlycténulaire)† (H19.2*)	

À l'exclusion de :

lupus vulgaire de la paupière (A18.4)

Chapitre II

Tumeurs

(C00-D48)

Tumeurs malignes

(C00-C97)

Tumeurs malignes, primitives ou présumées primitives, de siège précisé, à l'exception des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés

(C00-C75)

Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx

(C00-C14)

C00 Tumeur maligne de la lèvre

C00.0 Lèvre supérieure, bord libre

Lèvre supérieure :

- SAI
- extérieur
- zone ~~d'application du rouge à lèvres~~ vermillon de la lèvre

C00.1 Lèvre inférieure, bord libre

Lèvre inférieure :

- SAI
- extérieur
- zone ~~d'application du rouge à lèvres~~ vermillon de la lèvre

Chapitre XXII

Codes d'utilisation particulière

(U00-U99)

Classement provisoire d'affections nouvelles d'étiologie incertaine

(U00-U49)

U07 ~~Usage urgent de U07~~ Affections d'étiologie incertaine

U07.0 ~~Usage urgent de U07.0~~ Affection liée au vapotage